

抗癌剤治療を受けられる患者さんへ

早めの受診が必要な症状

次に示すようなことがありましたら、すぐに病院の方へご連絡ください。

I. 感染症状がひどい場合

- 1) (抗生剤を服用していない場合) 38 度以上の発熱がある時
- 2) 抗生剤 (クラビット[®]など) を服用しているが、38 度台の発熱があり、水分も摂れず、ぐったりしている時
- 3) 抗生剤 (クラビット[®]など) を服用しているが、38 度台の発熱が 2 日間以上続く時
- 4) 抗生剤 (クラビット[®]など) を服用しているが、39 度以上の発熱がある時
- 5) 咳や痰がしつこくでて、止まらない時
- 6) 排尿時の痛み・残尿感・頻尿がある時

II. 脱水症状のひどい場合

- 1) 嘔気・嘔吐・口内炎・食欲不振などで、水分も摂れない時
- 2) 尿が普段より、極端に少ない時
- 3) 治療前に比べて、下痢が一日に 4 回以上でる時
人工肛門の方は、下痢が多く、日常生活に支障がある時

III. その他

- 1) 息切れ・呼吸が苦しい・普段に比べ脈が速い時
- 2) 真っ赤な血尿がでる時
- 3) 鼻血や歯肉からの出血が止まらない時
- 4) 普段と違い、黒い便がでる時
- 5) 手足が麻痺している時
*しびれだけの時は定期受診の時にお越しください。
- 6) 倦怠感が強く、動けない時
- 7) 普段の会話ができない、意識がもうろうとするなどの症状がある時
- 8) 腹痛や嘔気を伴う便秘のある時
- 9) 点滴した部位の発赤・痛み・腫れなどの異常がある時
- 10) 発疹が急にでてきた時

*その他、心配な症状がありましたら、電話でご相談ください。

連絡先：松江赤十字病院 平日 8 時 30 分～16 時 50 分 各科外来・外来化学療法室
平日 16 時 50 分以降・休祭日 救急外来

*救急外来では救急患者さんと混雑している時があります。

少しお待ちいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

電話番号 0852-24-2111 (代表)