

適応疾患名	レジメン名	抗がん剤・用法	1クール日数
急性骨髄性白血病	Ara-C+ベネトクラクス	1～10日目:キロサイド注 (休日分は中止または平日にずれることがあります。) 連日:ベネクレクスタ錠	28日
急性骨髄性白血病	アザシチジン(75)(点滴)+ベネトクラクス	1～7日目:アザシチジン注 (休日分は中止または平日にずれることがあります。) 連日:ベネクレクスタ錠	28日
急性骨髄性白血病	アザシチジン(75)(皮下注)+ベネトクラクス	1～7日目:アザシチジン注 (休日分は中止または平日にずれることがあります。) 連日:ベネクレクスタ錠	28日
急性リンパ性白血病	ALL202-O(25歳以上)維持療法	1日目:オンコビン注 1～5日目:プレドニゾロン錠内服(5日間服用23日間休薬) 1、8、15、22日目:メソトレキセート錠内服 1～28日目:ロイケリン散内服	28日
急性リンパ性白血病	U-ALL202維持療法(1)	1、15、29日目:メソトレキセート注 1～28日目:ロイケリン散内服 29日目:メソトレキセート注、キロサイド注、ソル・コーテフ注(髄注)	42日
急性リンパ性白血病	U-ALL202維持療法(2)	1、8、15日目:オンコビン注 2、9、16日目:ロイナーゼ注 8日目:エンドキサン注	28日
急性リンパ性白血病	U-ALL202維持療法(3)	1～14日目:プレドニゾロン内服 1、15、29日目:メソトレキセート注 29日目:メソトレキセート注、キロサイド注、ソル・コーテフ注(髄注) 1～28日目:ロイケリン散	28日
急性リンパ性白血病	U-ALL202維持療法(4)	1、8、15日目:オンコビン注 2、9、16日目:ロイナーゼ注 8日目:ピノルビン注 1～14日目:プレドニゾロン内服	28日