

適応疾患名	レジメン名	抗がん剤・用法	1クール日数
食道がん	CDDP(40)+5FU(400)(放射線併用)	1、8日目:シスプラチン注 1~5、8~12日目:フルオロウラシル注(持続)	35
食道がん	CDDP(70)+5FU(700)(放射線併用)	1日目:シスプラチン注 1~4日目:フルオロウラシル注(持続)	28
食道がん	CDDP(80)+5FU(800)	1日目:シスプラチン注 1~5日目:フルオロウラシル注(持続)	28
食道がん	DOC(70)	1日目:ドセタキセル注	21
食道がん	weeklyPTX(100)(6投1休)	1、8、15、22、29、36日目:パクリタキセル注	49
食道がん	アクプラ(100)+5FU(800)	1日目:アクプラ注 1~5日目:フルオロウラシル注(持続)	28
食道がん	ニボルマブ(240)	1日目:オブジーボ注	14
食道がん	ニボルマブ(240)+CDDP(80)+5FU(800)	1、15日目:オブジーボ注 1日目:シスプラチン注 1~5日目:フルオロウラシル注(持続)	28
食道がん	ニボルマブ(480)	1日目:オブジーボ注	28
食道がん	ニボルマブ(480)+CDDP(80)+5FU(800)	1日目:オブジーボ注 1日目:シスプラチン注 1~5日目:フルオロウラシル注(持続)	28
食道がん	ヘムブ®ロリス®マブ(200)	1日目:キイトルーダ注	21
食道がん	ヘムブ®ロリス®マブ(200)+5FU(800)	1日目:キイトルーダ注、 1~5日目:フルオロウラシル注(持続)	21
食道がん	ヘムブ®ロリス®マブ(200)+CDDP(80)+5FU(800)	1日目:キイトルーダ注、シスプラチン注 1~5日目:フルオロウラシル注(持続)	21
食道がん	ヘムブ®ロリス®マブ(400)	1日目:キイトルーダ注	42