

抗がん剤治療を受けられる患者様へ

早めの受診が必要な症状

次に示すようなことがありましたら、すぐに病院の方へご連絡ください。

I. 感染症状がひどい場合

- 1) (抗生剤を服用していない場合)38度以上の発熱がある時
- 2) 抗生剤を服用しているが、38度台の発熱があり、水分も摂れず、ぐったりしている時
- 3) 抗生剤を服用しているが、38度台の発熱が2日間以上続く時
- 4) 抗生剤を服用しているが、39度台以上の発熱がある時
- 5) 咳や痰がしつこく出て、止まらない時
- 6) 排尿時の痛み・残尿感・頻尿がある時

II. 脱水症状がひどい場合

- 1) 嘔気・嘔吐・口内炎・食欲不振などで、水分も摂れない時
- 2) 尿が普段より、極端に少ない時
- 3) 治療前に比べて、下痢が一日に4回以上出る時
人工肛門の方は、下痢が多く、日常生活に支障がある時

III. その他

- 1) 息切れ・呼吸が苦しい・普段に比べ脈が速い時
- 2) 真っ赤な血尿がでる時
- 3) 鼻血や歯肉からの出血が止まらない時
- 4) 普段と違い、黒い便が出る時
- 5) 手足が麻痺している時
* しびれだけの時は定期受診の時にお越し下さい。
- 6) 倦怠感が強く、動けない時
- 7) 普段の会話ができない、意識がもうろうとするなどの症状がある時
- 8) 腹痛や嘔気を伴う便秘のある時
- 9) 点滴した部位の発赤・痛み・腫れなどの異常がある時
- 10) 発疹が急にでてきた時

* その他、心配な症状がありましたら、電話でご相談ください。

連絡先：松江赤十字病院 平日 08時30分～16時50分 各科外来・外来化学療法室

平日 16時50分以降・休祭日 救急外来

※ 救急外来では救急患者さんで混雑している時があります。

少しお待ちいただくことがありますので、あらかじめ、ご了承ください。

電話番号：0852-24-2111(代表)