患者ID：　　患者氏名：　　様

乳癌抗癌剤治療における連携パス（医療者用）

＊ 治療の間の副作用対策は連携施設で行う。
＊ 緊急時、連携施設に相談、松江赤十字病院救急外来受診も可。
＊ 定期受診日以外でも必要があれば松江日赤を受診のこと。

アウトカム
1. 治療コンプライアンス良好（支持療法剤も含む）。
2. 抗癌剤の有害事象に早期に対応できる。
3. 有害事象のマネージメントが出来る。
4. 連携医と病院医師が協力し、パスに沿った最適な医療が提供できる。

治療方法　□ 術前化学療法　□ 術後補助療法
レジメン　□ FEC⇒タキサン　□ EC療法　□ TC療法　□ FEC⇒タキサン＋ハーセプチン　□ タキソテール　□ TCH療法　□ TAC療法
初回入院　□ なし　□ あり　（　年　月　日 ～　年　月　日 ）
閉経状況　□ 閉経前　□ 閉経後
放射線治療　□ なし　□ あり　（ □ 温存乳房　□ 胸壁　□ 鎖骨上窩　□ 胸骨傍　）

		松江日赤	連携施設	松江日赤	連携施設	松江日赤	連携施設	松江日赤	連携施設
	レジメン名	□ FEC療法	□ EC療法	□ TC療法		□ タキソテール		□ TCH療法	□ TAC療法
	治療開始後	初回治療 年 月 日	10～14日目 年 月 日	2サイクル目 年 月 日	10～14日目 年 月 日	3サイクル目 年 月 日	10～14日目 年 月 日	4サイクル目 年 月 日	10～14日目 年 月 日
連携、連絡	治療後連携の説明	●							
	併存疾患・処方内容の確認	●							
	有害事象等発生時の連絡先確認	●							
診察	問診　副作用自己チェックシート参照	●	●	●	●	●	●	●	●
	確認　感染徴候の有無	●	●	●	●	●	●	●	●
	経口摂取量	●	●	●	●	●	●	●	●
	注射部位の異常	●	●	●	●	●	●	●	●
	精神状態（うつ状態）	●	●	●	●	●	●	●	●
	その他有害事象の有無	●	●	●	●	●	●	●	●
	検査　胸部写真	●	△	△	△	△	△	△	△
	末梢血（分画）	●	●	●	●	●	●	●	●
	生化学（肝腎機能、CRP）	●	●	●	●	●	●	●	●
	検尿	●	●	●	●	●	●	●	●
投薬	処方　□ 支持療法剤（制吐剤、抗潰瘍剤）	●		●		●		●	
	□ ワイパックス処方（次回用）	●		●		●		●	
	□ 抗生剤処方（感染時服用分）	●		●		●		●	
	服薬状況確認	●	●	●	●	●	●	●	●
	併用薬チェック	●	●	●	●	●	●	●	●
	抗生剤（必要時、点滴、経口追加）		△		△		△		△
	G-CSF投与（必要時）		△		△		△		△
説明 支援	患者用パス	●							
	副作用対策（特に感染対策）	●		●		●		●	
	服薬指導	●							
	生活支援	●							
	次の化学療法の内容説明／同意書取得							●	